Ballena Franca Austral (Eubalaena australis)

Nombres Comunes_

Otros nombres comunes son Jacurutu, Búho cornudo, Búho de orejas, Búho grande, Búho virginiano, Lechuza de la sierra, Ñuco y Quitilipe.

Descripción_

Distribución y Hábitat_

El Ñacurutú se distribuye ampliamente desde la región Neártica en Alaska hasta Argentina en Sudamérica. Se puede distribuir en casi todos los climas, con excepción de la tundra y en áreas tropicales lluviosas está presente esporádicamente.

Se lo puede ver en todo el territorio nacional en cualquier tipo de monte tanto autóctono como exótico. También en parques de algunos centros urbanos.

Comportamiento_

Tiene un comportamiento pasivo. Es de hábitos nocturnos durante el día descansa (excepto en la

temporada de reproducción), es posible observarlo entre la vegetación durante el día. Durante la noche te su mayor actividad.

• Alimentación

La alimentación de esta especie es muy variada, ya que es una especie generalista y oportunista y puede hacer uso de una amplia variedad de recursos. Algunas de las presas comunes son conejos, ratones, coatíes, zorrillos, diferentes especies de aves, reptiles e insectos. En general es sedentaria, pero se puede movilizar si el alimento escasea o no está disponible en su lugar de residencia.

Al carecer de dientes, las aves se tragan sin masticar los alimentos. Las rapaces nocturnas, en concreto, se tragan enteras a sus presas de menor tamaño, las presas mayores, como ratas, son divididas en pedazos antes de tragarlas, sin masticar. Sólo las rapaces nocturnas de mayor tamaño, cuando cazan animales grandes como conejos o perdices, pelan parciamente a sus presas antes de comérselas. El resto de presas son engullidas enteras.

Una egagrópila es una bola de restos orgánicos que regurgitan algunas especies de aves y que contienen las partes indigeribles de su alimento.

• Reproducción

Nidifica de junio a septiembre. Utiliza nidos de otras aves como por ejemplo de Cotorra, incluso mientras

que están activos; también de Carancho. También puede construir una plataforma de palitos, usar huecos de árboles o anidaren el suelo. Pone aproximadamente 3 o 2 huevos blanco los cuales incuba durante 30 días.

Bibliografía_

*1_*

*2_*

*3_*

4

5

6

7

8

9